





อบต.บางยี่โท จ.พระนครศรีอยุธยา

20 กันยายน 2022

...

🎉🎊วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น.🎊🎉

น.ส.นภมล หวังเทพอนุเคราะห์ (นายก อบต.บางยี่โท) เป็นประธานเปิด


การอบรมโครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช่างเหล็ก (พิบูลเกียรติ) โดยมี นายประสิทธิ์

สืบตระกูล (รองนายก อบต.บางยี่โท),

นายชัยณรงค์ ไวยัติ (ปลัด อบต.บางยี่โท), นายภัญญู เข้มปัญญา

(ผอ... ดูเพิ่มเติม





อบต.บางยี่โท จ.พระนครศรีอยุธยา


13 กันยายน 2022

👉 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. 👈

น.ส.นฤมล หวังเทพอนุเคราะห์ (นายก อบต.บางยี่โท) มอบหมายให้  
นายประสิทธิ์ สืบตระกูล (รองนายก อบต.บางยี่โท) พร้อมด้วย  
นายชัยณรงค์ ไวยัติ (ปลัด อบต.บางยี่โท)

ทำพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้ความรู้โภชนาการ สุขภาพช่องปากและฟันที่ถูกต้องวิธีสำหรับนักเรียน ณ  
โรงเรียนวัดสุนทราราม

🌸🌸 ส... ดูเพิ่มเติม



+16



อบต.บางยี่โท จ.พระนครศรีอยุธยา

27 กันยายน 2022

✨วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ✨

🙏 น.ส.นฤมล หวังเทพอนุเคราะห์ (นายก อบต.บางยี่โท)


, นายประสิทธิ์ สืบตระกูล (รองนายก อบต.บางยี่โท), นายภิญโญ เข้มปัญญา

(ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม) ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ห่อหมก

ซึ่งจัดโดยเครือข่ายสุขภาพตำบลห่อหมก 🙏🙏🙏

🌸🌸 ส... ดูเพิ่มเติม




+12

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2565



สำเนาถูกต้อง



ภาพถ่าย

อบรม โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2565

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดช้างเหล็ก(พิบูลเกียรติ)

วันที่ 21 กันยายน 2565






โครงการ ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพื่อป้องกันโรคภาวะแทรกซ้อน

ตำบลช้างเหล็ก ปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างเหล็ก



ถ้าหากถูกต้อง

(นายไพศาล พูลศิลป์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างเหล็ก





ดำเนินการถูกต้อง



(นายไพศาล พูลศิลป์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างเหล็ก



## อบรมโครงการยาปลอดภัย ประจำปี 2565

วันที่ 21 กันยายน 2565 ณ รพ.สต.หน้าไม้



การฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับโรคภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ภาวะเส้นเลือดในสมอง แตก ตีบ ตัน และการปฐม  
พยาบาลเบื้องต้น

ตำบลช้างเหล็ก ปี 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565


ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างเหล็ก



สำเนาถูกต้อง

(นายไพศาล พูลศิลป์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างเหล็ก



สำเนาถูกต้อง

(นายไพศาล พูลศิลป์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลช้างเหล็ก

ไม่ให้สัมผัสกับด้านนอกของถุงยาง ควรสันนิษฐานว่า  
ด้านนอกของถุงยาง อาจจะปนเปื้อนเชื้อเอดส์แล้ว



- ทั้งถุงยางอนามัยที่ใช้แล้ว ลงในภาชนะรองรับ เช่น  
ถังขยะ

### เอดส์ รู้ได้อย่างไรว่า ติดแล้ว

เนื่องจากโรคนี้แสดงอาการช้า แต่สามารถทราบได้ โดย  
การตรวจเลือด หากต้องการผลที่แม่นยำ ควรตรวจ  
ภายหลังจากมีพฤติกรรมเสี่ยง 6 สัปดาห์ขึ้นไป

### เอดส์ รักษาได้หรือไม่

ขณะนี้ยังไม่มียารักษาโรคเอดส์ให้หายได้ ยาที่ใช้  
ปัจจุบันจะช่วยยับยั้ง ไม่ให้ไวรัสเอดส์เพิ่มจำนวนมาก  
ขึ้น ในร่างกายผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยเอดส์จะมีสุขภาพ  
แข็งแรง สามารถทำงานได้ตามปกติ

### เอดส์ ใครบ้างที่ควรตรวจหาเชื้อเอดส์

- ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อ  
เอดส์หรือไม่
- ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่ หรืออยู่กินฉันท์สามีภรรยา
- ผู้ที่สงสัยว่า คู่นอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง

ผู้ที่คิดจะมีบุตร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของแม่และลูก  
- ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย และ  
สุขภาพของร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องไปทำงานใน  
ต่างประเทศ (บางประเทศ)

### เอดส์ เราอยู่ร่วมกันได้

คนที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี สามารถอยู่ร่วมกับสังคม และ  
ครอบครัวได้ และทำงานได้เหมือนกับคนทั่วไป เพราะ  
เชื้อเอช ไอ วี ไม่ได้ติดต่อกันโดย การสัมผัส การกอด  
จูบ การรับประทานอาหาร การจับถ้าย การใช้ของ  
ร่วมกัน การอยู่ใกล้กัน การสนทนากัน หรือถูกยุงกัด  
ดังนั้น จึงไม่ต้องแยกวงรับประทานอาหาร ไม่ต้องแยก  
ห้องนอน ห้องน้ำ อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ หรือห้องทำงาน

### บริการปรึกษา ปัญหาสุขภาพ

- กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ  
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร. 0-2286-0431, 0-2286-4483
- โรงพยาบาลบาราศณราตุ โทร. 0-2590-3737, 0-2590-3510
- กองควบคุมโรคเอดส์ กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ต่อ 407-8
- มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ โทร. 0-2277-7699, 0-2277-8811  
(โทรฟรี)
- มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0-2372-2222
- สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง




**เอดส์ ... หยุดได้ ถ้าทุกคน  
ร่วมใจหยุดเสี่ยง**



องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โทและ  
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางยี่โท  
อ.บางโพธิ์ จ.พระนครศรีอยุธยา  
โทร. /โทรสาร 035-785032

## เอดส์ ... หยุดได้ ถ้าทุกคนร่วมมือ หยุดเสี่ยง



### เอดส์ คืออะไร

เอดส์ หรือ AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำให้ติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรงและเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต

### เอดส์ ติดต่อกันได้อย่างไร

1. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่าชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ทั้งช่องทางธรรมชาติ หรือไม่ธรรมชาติ ก็ล้วนมีโอกาสติดโรคนี้ได้ทั้งสิ้น และปัจจัยที่ทำให้มีโอกาสติดเชื้อมากขึ้น ได้แก่ การมีแผลเปิด และจากข้อมูลของสำนักกระบวนวิทยาประมาณร้อยละ 84 ของผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์
2. การรับเชื้อทางเลือด
  - ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด และหากคนกลุ่มนี้ติดเชื้อก็สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ ทางเพศสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง

- รับเลือดในขณะผ่าตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด ในปัจจุบันเลือดที่ได้รับบริจาคทุกขวด ต้องผ่านการตรวจหาการติดเชื้อเอดส์ และจะปลอดภัยเกือบ 100%

3. ทารก ติดเชื้อจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ การแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก ผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์ หากตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแลอย่างดี เชื้อเอช ไอ วี จะแพร่ไปยังลูกได้ ในอัตราร้อยละ 30 จากกรณีเกิดจากแม่ติดเชื้อ จึงมีโอกาที่จะรับเชื้อเอช ไอ วี จากแม่ได้

### ป้องกันตัวเอง ไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ ได้อย่างไร

รักเดียว ใจเดียว หากจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ที่มีเพศสัมพันธ์  
ขอรับบริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส์ ก่อนแต่งงาน และก่อนที่จะมีบุตรทุกท้อง  
ไม่ดื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด

### วิธีใช้ถุงยางอนามัย



- หลังจากตรวจสอบว่า ถุงยางอนามัยไม่หมดอายุ ของไม่มีรอยฉีกขาด ฉีกมุมของโดยระมัดระวัง ไม่ให้เล็บมือเกี่ยวถุงยางอนามัยขาด



- ใช้ถุงยางอนามัยในขณะที่อวัยวะเพศแข็งตัว บีบปลายถุงยาง เพื่อไล่อากาศ



- รูดถุงยางอนามัย โดยให้ม้วนขอบอยู่ด้านนอก



- สวมถุงยางอนามัย แล้วรูดให้ขอบถุงยางอนามัยถึงโคนอวัยวะเพศ



- หลังเสร็จกิจ ควรรีบถอดถุงยางอนามัย ในขณะที่อวัยวะเพศยังแข็งตัว โดยใช้กระดาษชำระหุ้มถุงยางอนามัยก่อนที่จะถอด หากไม่มีกระดาษชำระต้องระวัง

## ร่วมมือกันทำ

หากใครยังไม่ทราบว่าเราควรกำจัดลูกน้ำยุงลาย  
อย่างไรจึงจะถูกวิธี และได้ผลจริง ลองมาดูคำแนะนำ  
ง่าย ๆ แต่ได้ผลดีในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เกิดใน  
แต่ละภาชนะ ที่ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ เคยแนะนำไว้  
ใน นิตยสารหมอชาวบ้าน รับรองว่าเป็นประโยชน์  
มากทีเดียว ภาชนะที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่  
สำคัญตามลำดับในบ้านของท่านผู้อ่าน ได้แก่

๑. โองน้ำใช้
๒. ขาตุ้กันมด
๓. โองน้ำตีม
๔. ถังซีเมนต์ในห้องน้ำ
๕. ภาชนะอื่น ๆ เช่น จ


ต้นไม้ ไถ แจกันพลูต่าง ยางรถยนต์ ที่ใส่น้ำให้สัตว์  
เป็นต้น

๒. โอ่งซีเมนต์ขนาดใหญ่ (โอ่งจัมโบ้)

ท่านควรจะหาเวลาสำรวจสถานะเหล่านี้เป็นประจำ ถ้าพบว่ามีลูกน้ำก็แก้ไขได้เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ว่าเป็นลูกน้ำยุงลาย

การป้องกันไม่ให้ยุ่งลายกั๊ด เช่น ครอบมุ้ง เวลาลูก ๆ นอนตอนกลางวัน หรือจุกยากันยุง ฉีดพ่นยากันยุง เป็นสิ่งที่ควรทำ แต่การกำจัดลูกน้ำยุงก่อนที่จะกลายเป็นยุงลาย เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาดตรงต้นเหตุและได้ผลดีกว่า ซึ่งท่านสามารถจะดำเนินการได้ด้วยตนเอง และจะดียิ่งขึ้นถ้าท่านชักชวนเพื่อนบ้านใกล้เคียงกำจัดลูกน้ำยุงลายไปพร้อมกัน

## การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ ลูกน้ำยุงลาย



ประชาชนทุกคน  
ร่วมกันป้องกันยุ่งลาย



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางยี่โท

อำเภอบางไทร  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร ๐๓๕-๗๘๕๐๓๒



อบต.บางยี่โท

[www.Bangyeetho.go.th](http://www.Bangyeetho.go.th)

## การจัดลูกน้ำยุงลายที่เกิดในแต่ละภาชนะ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำง่าย ๆ แต่ได้ผลดีในการกำจัดลูกน้ำยุงลายที่เกิดในแต่ละภาชนะ

๑. ภาชนะที่เก็บน้ำไว้เพื่อกิน หรือใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น โอ่งน้ำดื่ม หรือโอ่งน้ำใช้ โอ่งซีเมนต์ในห้องน้ำ ฯลฯ ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างการใส่ทรายอะเบท หรือการปล่อยปลาหางนกยูง หรือปลาสอด หรือปลากัดเพื่อกินลูกน้ำ และถ้าปิดฝาได้ก็ยิ่งดีใหญ่ เพราะยุงจะลงไปไข่ลำบากขึ้น

ทรายอะเบทเป็นทรายที่เคลือบยาฆ่าลูกน้ำ แต่ไม่มีอันตรายต่อคน ยาที่เคลือบอยู่จะค่อย ๆ ละลายออกมาและมีฤทธิ์อยู่นาน ๓ เดือน ดังนั้น จึงต้องเติมทรายอะเบททุก ๓ เดือน ปริมาณที่ใช้คือ ๑ ช้อนโต๊ะต่อน้ำ ๑๐ ปีบ (โอ่งมังกร)

การปล่อยปลาในลูกน้ำจะปล่อยโอ่งละ ๒ ตัว และถ้าปลาหายไปให้เพิ่มปลาเท่าเดิม สามารถขอปลาได้จากสถานบริการสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอทั่วไป

ท่านควรจะต้องสนใจเลือกใช้วิธีที่ท่านชอบ เพราะทั้งสองวิธีได้ผลทั้งคู่ ในกรณีที่ไม่ว่าทั้งสองอย่าง อย่างน้อยก็ขอให้ท่านปิดฝาโอ่งมิดชิดด้วยฝาหรือตาข่ายพลาสติกหรือผ้าพลาสติก และล้างขัดถูผิวภายในโอ่ง และเทน้ำทิ้งทุก ๗ วัน

๒. ขาตุ้กันมด มักจะใส่น้ำหล่อไว้เพื่สกมดไต่ขาตุ้กับข้าว เราควรจะเปลี่ยนมาใส่ซี๊เถ้าที่เกิดจากถ่านหรือฟืนแทน หรือใส่น้ำมันซี๊ไล่ น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันอะไรก็ได้แทนน้ำ นอกจากจะไม่ต้องคอยเติมแล้ว ยังกันมดได้ดี และที่สำคัญยุงลายไม่ลงไปวางไข่แน่นอน

๓. แจกันดอกไม้ ใช้วิธีถ่ายน้ำทิ้งทุก ๗ วัน นอกจากจะกันยุงลายลงไปวางไข่แล้วยังช่วยให้ต้นมีน้ำสะอาดเสมอ

๔. ภาชนะที่มีน้ำขังอื่น ๆ ที่อยู่รอบบ้าน เช่น ยางรถยนต์ กระจบอง ถึง หรือขวดพลาสติกต่าง ๆ ใช้วิธีขุดหลุมฝัง หรือทำลายทิ้งด้วยวิธีอื่น ๆ อย่าเสียดายมันเลยนะครับ

คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและคุณครูที่รักเด็ก ๆ ของท่าน นอกจากท่านจะมีหน้าที่ในการหาอาหารเครื่องนุ่งห่ม ของเล่น สอนหนังสือ ฯลฯ ให้เด็ก ๆ ของท่านแล้ว หน้าที่ในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน ในโรงเรียน เป็นหนทางสำคัญที่ท่านจะช่วยคุ้มครองบุตรหลานของท่านได้

ไม่มีใครเลี้ยงฆาตกรในบ้าน เช่นเดียวกันอย่าเลี้ยงยุงลายไว้ในบ้านของท่าน กำจัดลูกน้ำยุงลายก่อนที่ยุงลายจะทำร้ายลูกของท่าน จำคาถาฉบับนี้ไว้ นะครับ ไม่มียุงลาย-ไม่มีไข้เลือดออก



## วิธีป้องกันและกำจัดยุงลายด้วยผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน

ของใช้ในบ้านที่สามารถนำมากำจัดยุงได้ คือ สารซักล้างทั่วไป เช่น น้ำยาล้างจาน สบู่เหลว แชมพูสระผม ผงซักฟอก ซึ่งเราใช้กันอยู่เป็นประจำในครัวเรือน กลุ่มนี้เราเรียกว่าสารลดแรงตึงผิวกลุ่มซักล้างทำความสะอาด ซึ่งถ้าเรานำมาละลายน้ำก็สามารถใช้เป็นอาวุธฉีดกำจัดแมลงได้

โดยธรรมชาติของแมลงจะมีแว็กซ์เคลือบตัวอยู่ มันจะไม่เปียกน้ำ แต่ถ้าเราเอาสารลดแรงตึงผิวฉีดใส่ตัวแมลงจะทำให้แมลงเปียกตัว และขณะที่มันกำลังดิ้นรนหนีมันก็จะดูดเอาสารลดแรงตึงผิวเข้าไปสู่ระบบหายใจ ทำให้ไปล้างเยื่อเมือกในท่อระบบหายใจทำให้การหายใจไม่สมบูรณ์

การผสมน้ำยาเพื่อฆ่าแมลงจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำยาดูด ถ้าเราต้องการแค่ยับยั้งการมารบกวน แต่ไม่ต้องการฆ่าก็ผสมน้ำยาอ่อนลงกว่าปกติ ในช่วงของการเพาะพันธุ์ ในเวลาเช้าจะสังเกตเห็นตัวยุงลายเกาะอยู่ตามผิวน้ำ มันจะยังไม่ตื่นตัวที่จะบินออกมาภายนอก ถ้าเราใช้สารลดแรงตึงผิว อย่างเช่น น้ำยาล้างจานอ่อนๆ ฉีดพรมลงไปยุงที่เกาะอยู่บริเวณนั้นก็จะจมน้ำทันที